

## HBV und HCV-Testempfehlungen

Die Schweizerische Hepatitis-Strategie empfiehlt folgenden Personen einen HBV und/oder HCV-Test:

- Intravenöser oder intranasaler Drogenkonsum, aktuell oder in der Vergangenheit
- HIV-positive Personen
- Schwangere Frauen und Kinder von Frauen, die mit HBV und/oder HCV infiziert sind
- Für HCV: Personen, die zwischen 1950 und 1985 geboren sind (Screening von Geburtsjahrgängen)
- Gefängnisinsassen oder Personen, die früher inhaftiert waren
- Personen, die Tattoos oder Piercings unter hygienisch nicht einwandfreien Bedingungen anbringen liessen
- Personen, die HBV-infizierte Sexualpartner haben
- Migrantinnen oder Migranten aus endemischen Gebieten und in Asylunterkünften
- Patienten, die in einer Dialyse-Behandlung sind
- Empfängerinnen und Empfänger von Blutprodukten vor 1992 in der Schweiz
- Patientinnen und Patienten, die sich invasiven Prozeduren in Gesundheitseinrichtungen unterzogen haben, welche ungenügende Infektionskontroll-Praktiken aufweisen
- Patienten mit erhöhten Transaminasen oder einer chronischen fortgeschrittenen Lebererkrankung